



## BIÓPSIA DE PRÓSTATA

### Orientação

- 1 - Parar de tomar Aspirina, AAS, Melhoral, Somalgin e anticoagulantes 10 dias antes do exame.
- 2 - Vir acompanhado.
- 3 - Trazer resultados de exames de laboratório: PSA e tempo de coagulação.
- 4 - Trazer uma requisição médica solicitando "Exame anatomopatológico de próstata" para ser remetida para o laboratório de patologia, de acordo com seu convênio.

### VESPERA DO EXAME

- Tomar 1 comprimido de NORFLOXACINO 400 mg às 8:00h da manhã e 1 comp. às 20:00h.
- Tomar 1 comprimido de DULCOLAX às 16:00h.

### DIA DO EXAME

- Tomar 1 comprimido de NORFLOXACINO 400 mg às 8:00h da manhã.
  - Ficar em jejum de 4 horas.
  - Fazer um FLEET-ENEMA ou PHOSPHONEMA 1h. antes do exame.
- Obs.: O paciente poderá trazê-lo para ser administrado na clínica.

### APÓS A BIÓPSIA:

- Tomar por mais 6 dias os comp. de NORFLOXACINO 400 mg de 12 em 12 horas.
- Se sentir dor tomar analgésicos.
- Evitar exercícios e relação sexual por 5 dias.
- O paciente pode encontrar sangue nas fezes, urina ou esperma por vários dias.